



Co kvete v Brně duben 2020



Botanické oddělení Moravského zemského muzea



javor mlíč

(*Acer platanoides*)

- strom, který roste často v suťových lesích, jako náletová dřevina u plotů, zdí a často je pěstovaný v parcích
- kvete před rašením listů



zlatice prostřední

(Forsythia xintermedia)

- nenáročný keř, hojně pěstovaný v parcích, zahradách
- na větvích jsou dobře viditelné lenticely, kvete před olistěním, listy vstřícné
- vznikla křížením čínských zlatic, u nás poprvé vysazena 1910 v parku v Průhonicích






šácholan Soulangeův

(magnólie Soulangeova,
Magnolia ×soulangeana)

- často pěstovaný keř nebo nízký strom
- bohatě kvete před olistěním, květy jsou nejčastěji růžové
- byl pojmenován po svém šlechtiteli Soulange-Bodin



trnka obecná
(*Prunus spinosa*)

- u nás častěji v teplejších oblastech, na okrajích lesů, u cest
- keř, kvete před vyrašením listů, květy bílé
- používána v léčitelství, trpké plody slouží k výrobě vín, marmelád



mahónie
cesmínolistá
(*Mahonia*
aquifolium)

- pochází ze Severní Ameriky, často se pěstuje v parcích a zahradách, zplaňuje
- vždyzelený keř s lichozpeřenými listy
- větvičky se používají do ozdobných rostlinných vazeb
- její dřevo obsahuje mírně jedovaté alkaloidy



zákula japonská
(*Kerria japonica*)

- keř původem z Japonska a Číny, u nás poprvé 1835 v pražské Stromovce
- pěstuje se plnokvětá forma i jednoduše kvetoucí



kdoulovec ozdobný

(*Chaenomeles speciosa*)

- pochází z Asie, často je vysahován do zahrad a parků
- keř s výraznými červenými (výjimečně bílými) květy
- plody jsou vonné žlutozelené malvice



sedmikráska

obecná

(chudobka,

Bellis perennis)

- u nás hojná, ráda roste v lidských sídlech
- při mírné zimě kvete téměř celý rok
- používá se jako léčivka, sbírají se květní úbory, přidává se do bylinných čajů a také do jarních salátů

pampeliška (smetanka obecná, s. lékařská, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*)

- skupina obtížně rozlišitelných druhů, je jich asi 250, vyskytují se kosmopolitně, rostou hojně na člověkem ovlivněných stanovištích
- patří k léčivým bylinám a významným včelařským rostlinám, čerstvé listy se používají do bylinkových salátů





popenec obecný (*Glechoma hederacea*)

- vyskytuje se hojně, roste na pasekách, v sadech, lesích, na loukách, v parcích a zahradách
- nekvetoucí lodyhy jsou většinou plazivé, kvetoucí lodyhy krátce vystoupavé
- používá se jako léčivka, v kuchyni se využívá nať např. do nádivek a salátů



prvosienka jarní

(*Primula veris*)

- poměrně hojná, roste ve světlých listnatých lesích, jejich lemech a také trávnících, někdy je pěstována (zahrady přírodního stylu, skalky)
- léčivá bylina
- živná rostlina housenek ohroženého motýla pestrobarvece petrklíčového
- podle pověstí představuje klíč, kterým svatý Petr otevírá jaro



ptačinec prostřední (ptačinec žabinec, *Stellaria media*)

- roste často jako plevel, na narušených místech, polích, v zahradách, parcích
- drobná, jednoletá bylina, má poléhavou lodyhu, vstřícné listy a drobné květy
- je oblíbenou pastvou drůbeže



pumpava obecná (*Erodium cicutarium*)



pumpava obecná (*Erodium cicutarium*)

- vyskytuje se roztroušeně až hojně, v trávnicích, na polích, zahradách, u cest, na železničních náspech
- bylina s poléhavou lodyhou, listy jsou zpeřené, květenství na dlouhých stopkách
- plod je zobanitý poltivý, za zralosti puká a nažky jsou vymršťovány do vzdálenosti až dvou metrů, nažky mají dlouhou osinu, ta je spirálovitě stočená, reaguje na změnu vlhkosti a tak zavrtává nažku do půdy



plevel okoličnatý (*Holosteum umbellatum*)

plevel okoličnatý (*Holosteum umbellatum*)

- vyskytuje se roztroušeně až hojně zejména v teplejších oblastech, roste na stráních, u okrajů cest, na polích, na náspech železničních tratí
- jednoletá drobná bylina
- patří mezi efemery – rostliny s velmi rychlým životním cyklem, žijí několik týdnů, využijí krátký čas s optimálními podmínkami, po odkvetení a dozrání semen rychle hynou, zbytek roku přečkávají ve formě semen





kokoška pastuší tobolka (*Capsella bursa-pastoris*)

- roste na polích jako plevel, na rumišťích, okrajích cest, v zahradách
- laločnaté až peřenosečné listy jsou v přízemní růžici, květy má drobné, bílé, plody jsou šešulky
- léčivá rostlina



vlaštovičník větší (*Chelidonium majus*)

- roste v zahradách, u cest, na rumištích
- při poranění oranžově mléčí
- jedovatý, používá se ve farmaceutickém průmyslu, při barvení látek, mlékem se potírají bradavice





podběl lékařský (*Tussilago farfara*)

- pionýrská rostlina narušených míst, roste na náspech, polích, v příkopech
- z oddenku vyrůstá lodyha se žlutým úborem, listy se vytvářejí po odkvětu
- květ je tradiční léčivka, která je však při dlouhodobém užívání nebezpečná



Budeme rádi, když nám napíšete do online návštěvní knihy: [bit.ly/nk Co kvete mesto](https://bit.ly/nk_Co_kvete_mesto)

Zápisy v online návštěvní knize:

[bit.ly/nk Co kvete mesto Odpovedi](https://bit.ly/nk_Co_kvete_mesto Odpovedi)

foto: S. Kubešová, K. Sutorý

text: S. Kubešová, K. Sutorý, s využitím botany.cz
a www.botanickafotogalerie.cz

Moravské zemské muzeum

duben 2020, upraveno v březnu 2022