



Co kvete v lesích okolo Brna duben 2020



Botanické oddělení Moravského zemského muzea



sasanka hajní (*Anemone nemorosa*)



sasanka hajní (*Anemone nemorosa*)

- hojný druh v evropských listnatých (a smíšených) lesích, ale roste také na loukách
- má jeden list rozdělený do tří dále členěných listenů, květy jsou bílé
- je jedovatá, bývala používána v léčitelství

sasanka pryskyřníkovitá
(*Anemone*
ranunculoides)

- u nás zejm. v listnatých lesích teplejších oblastí
- květ je žlutý
- je jedovatá





**zapalice
žlutúchovitá
(*Isopyrum
thalictroides*)**

- u nás roste na Moravě (vzácněji v Čechách)
- na rozdíl od sasanky má více květů a listů
- je jedovatá



jaterník podléška (*Hepatica nobilis*)

- má trojlaločné listy, které vyrůstají až po odkvětu a přezimují, květ je modrý (bílý, růžový)
- dříve používán v lidovém léčitelství, je slabě jedovatý



ostřice chlupatá

(*Carex pilosa*)

- u nás má těžiště výskytu na Moravě
- květonosná lodyha nese jeden vrcholový samčí klas a pod ním samičí klasy, listy jsou na okrajích chlupaté, tmavozelené a přezimující
- ostřice není tráva, jak by se mohlo zdát na první pohled, ale patří mezi šáchorovité





ostřice prstnatá
(*Carex digitata*)

- relativně hojný druh
- trsnatá rostlina, lodyha na vrcholu nese 3–4 klasy, které vyrůstají téměř ze stejného místa, připomínají tak prsty ruky
- ostřice není tráva, ale patří mezi šáchorovité



dřín jarní (*Cornus mas*)

- teplomilný keř, bývá také vysazovaný jako okrasná dřevina
- kvete časně z jara před olistěním, květy jsou drobné, žluté
- jedlé plody mají vysoký obsah vitamínu C



dymnivka dutá

(Corydalis cava)

- v zemi má dutou hlízu (odtud druhové jméno)
- nachové (nebo bílé) květy jsou v hroznu a mají vejčité listeny

**pryšec
madloňovitý**
(*Euphorbia
amygdaloides*)

- vytrvalá bylina
s dřevnatějícím
oddenkem
- listy v růžici,
vždyzelené
- stejně jako
u jiných pryšců
při poranění
vytéká bílé
mléko – latex





hrachor jarní (lecha
jarní, *Lathyrus vernus*)

- u nás se vyskytuje hojně
- listy jsou dělené – sudozpeřené, bez úponky
- květy se stářím mění barvu podle obsahu kyselin, poupata jsou červená (kyselé pH), rozkvetlé květy červenofialové, modré (neutrální pH), po odkvětu tyrkysové (zásadité pH)



hrachor jarní (*Lathyrus vernus*)

violka vonná

(*Viola odorata*)

- hojná našich v teplejších oblastech
- květy vonné, sytě modrofialové (i bílé)
- od středověku byla pěstovaná, bývala používána v lidovém léčitelství a pro voňavkářství
- jedlé květy můžete kandovat nebo zamrazit do kostek ledu, které ozdobí nápoje





violka Rivinova
(*Viola riviniana*)

- u nás hojná
- květy bledě modré s bílou ostruhou





bažanka vytrvalá
(*Mercurialis perennis*)

- kvete nevýrazně, je dvoudomá, tzn. existují samčí a samičí rostliny
- detail ukazuje část prodlouženého samčího květenství s prašníky





plicník lékařský
(*Pulmonaria*
officinalis)

- u nás roste roztroušeně až hojně
- lodyha je hustě štětinatě chlupatá, listy bíle skvrnité, chlupaté
- květy mají růžovo-červené až fialové koruny
- používá se v lidovém léčitelství při zánětech, nemocech dýchacích cest a trávicího ústrojí



česnáček lékařský (*Alliaria petiolata*)

- u nás roste nejhojněji v teplejších oblastech
- bylina vysoká 30–80 cm, bílé květy v hroznech
- listy po rozemnutí voní po česneku
- tradiční léčivá bylina, přísada do salátů



Budeme rádi, když nám napíšete do online návštěvní knihy: [bit.ly/nk Co kvete lesy](https://bit.ly/nk_Co_kvete_lesy)

Zápisy v online návštěvní knize:
[bit.ly/nk Co kvete lesy Odpovedi](https://bit.ly/nk_Co_kvete_lesy Odpovedi)

foto: S. Kubešová

text: S. Kubešová s využitím <https://botany.cz>
a <http://www.botanickafotogalerie.cz/>

Moravské zemské muzeum

duben 2020, upraveno v březnu 2022